

Mortalidad por suicidios ocurridos antes y durante la pandemia Covid-19, Paraguay, 2021

Ethel R. Santacruz ¹; Ana R. Denis ²

1 Ministerio de Salud Pública y Bienestar; erosantacruz@gmail.com; ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0112-1563>

2 Facultad de Enfermería y Obstetricia, Universidad Nacional de Asunción; adenis@fenob.una.py; ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9696-1743>

* Correspondencia del autor: erosantacruz@gmail.com; Tel .: +595981784550

Resumen:

Objetivo: analizar las características de la mortalidad por suicidios ocurrido antes y durante la pandemia en Paraguay periodo 2019 y 2020.

Métodos: estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, de las defunciones ocurridas por suicidios registrados en los datos abiertos del subsistema del Ministerio de Salud Pública del Paraguay, periodo 2019 y 2020 para el cálculo de las tasas se utilizó Epi-Info 7.

Resultados: del total de suicidios anual, un 75% fueron cometidos por hombres y las tasas de mortalidad anual se observa que son mayores los hombres y en la población general se registró alrededor de 7 por 100 mil habitantes y con mayor grupo etario son de 25 a 44 años con 32,4% y 33,7% en el año 2019 y 2020 respectivamente. En el nivel educativo alrededor de 27% tiene primaria completa, siendo el 76% de los suicidios son cometidos por personas solteras. La tasa de años de vida potencialmente perdidos un 2,46 y 2,62 por 10 mil habitantes que son las muertes de personas jóvenes.

Conclusiones: Las áreas urbanas de los Departamentos con mayores tasas, se ha encontrado en Alto Paraguay, Amambay y Central en el año 2020. En cuanto a las tasas de mortalidad más alta en el país es de hombres, en el grupo de adultos tempranos, siendo los solteros, consumado el suicidio mediante estrangulamiento y en su hogar. Se evidencia un leve aumento en las tasas generales a nivel anual, se registran más suicidios en meses de otoño/invierno.

Palabras clave: Suicidio; Mortalidad; Años Potenciales de Vida Perdidos